



























# 予防接種を計画的に受けましょう

定期予防接種対象年齢  
(期間：平成31年4月～令和2年3月)

下表の  および  は、予防接種法で定められた定期予防接種の対象者です。病気にかかりやすい時期を考慮して定められた期間(標準的な接種期間)である  の期間中にできるだけ接種を受けましょう。

| 定期予防接種対象年齢  |                       | 2   | 3 | 6 | 7 | 9 | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15   | 16              | 17 | 18 | 19 | 20 |   |  |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|----|---|----|----|----|------|-----------------|----|----|----|----|---|--|
| 予防接種の種類   |                       | カ   | カ | カ | カ | カ | カ  | カ | カ | カ | カ | カ  | カ | カ | カ | カ  | カ   | カ  | カ  | カ  | カ    | カ               | カ  | カ  | カ  | カ  | カ |  |
| ヒブ(インフルエンザ菌b型)                                    |                       |  2カ月～5歳未満                                    |   |   |   |   |  27～56日の間隔を空けて初回接種(3回)を受けます。初回接種終了後、7～13カ月の間隔を空けて追加接種(1回)を受けます。        |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |    |    |    |      |                 |    |    |    |    |   |  |
| 小児肺炎球菌  |                       |  2カ月～5歳未満                                    |   |   |   |   |  27日以上の間隔を空けて初回接種(3回)を受けます。初回接種終了後、60日以上の間隔を空けて生後12カ月以降に追加接種(1回)を受けます。 |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |    |    |    |      |                 |    |    |    |    |   |  |
| B型肝炎  |                       |  2カ月～1歳未満                                    |   |   |   |   |  27日以上の間隔を空けて2回接種した後、1回目接種から139日以上の間隔を空けて3回目を接種します。                    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |    |    |    |      |                 |    |    |    |    |   |  |
| 結核(BCG)   |                       |  1歳未満  |   |   |   |   |  生後5～8カ月の間に1回接種を受けます。  |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |    |    |    |      |                 |    |    |    |    |   |  |
| ジフテリア(D)・百日せき(P)・破傷風(T)・ポリオ(IPV)【DPT-IPV、DPT、IPV】 |                       |  3カ月～7歳6カ月未満                                 |   |   |   |   |  20～56日の間隔を空けて初回接種(3回)を受けます。初回接種終了後、12～18カ月の間隔を空けて追加接種(1回)を受けます。       |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |    |    |    |      |                 |    |    |    |    |   |  |
| ジフテリア・破傷風【DT】第2期                                  |                       |  11～13歳未満                                  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |    |    |    | 1回接種 |                 |    |    |    |    |   |  |
| 麻疹・風しん混合【MR】                                      |                       |  1～2歳未満                                      |   |   |   |   |  1回接種   |   |   |   |   |  平成25年4月2日～平成26年4月1日生(幼稚園などの年長児) |   |   |   |    |  1回接種      |    |    |    |      | 定期接種の期間にご注意ください |    |    |    |    |   |  |
| 水痘  |                       |  1～3歳未満                                      |   |   |   |   |  生後12～15カ月までに1回を受けます。1回目接種後、6～12カ月の間隔を空けて2回を受けます。                     |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |    |    |    |      |                 |    |    |    |    |   |  |
| 日本脳炎  | 平成19年4月2日生～           |  1期  |   |   |   |   |  6カ月～7歳6カ月未満  |   |   |   |   |  2期                            |   |   |   |    |  9～13歳未満 |    |    |    |      | 1回接種            |    |    |    |    |   |  |
|   | 平成19年4月2日～平成21年10月1日生 | <small>(特例措置) 平成22年3月31日までに日本脳炎第1期の予防接種が終了していない人は、生後6カ月～7歳6カ月に至るまでの間または9歳以上13歳未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。</small>          |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |    |    |    |      |                 |    |    |    |    |   |  |
|   |                       | <small>(特例措置) 予防接種実施規則により平成7年4月2日～平成19年4月1日に生まれた人は1期については20歳未満までの間、2期については9～20歳未満までの間に定期接種として接種ができるとされています。</small>           |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |    |    |    |      |                 |    |    |    |    |   |  |
| ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)                                |                       |  平成15年4月2日～平成20年4月1日生まれの子(小学6年生～高校1年生相当) |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |    |    |    |      |                 |    |    |    |    |   |  |

- 上記のうち、 は、生年月日の範囲を表しています。
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防ワクチンは、平成25年に厚生労働省から通知があり、現在接種を積極的にはお勧めしていません。ワクチンの副反応については調査中です。ただし、希望者は有効性とリスクを理解した上で接種することができますので、医師にご相談ください。
- 長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けることができなかつたと認められる人について、特別な事情がなくなった日から起算して2年間、定期予防接種の対象となります。ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児肺炎球菌は6歳に達するまで、BCGは4歳に達するまで、4種混合(DPT-IPV)は15歳に達するまでが年齢上限となります。
- スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。

## 7月から始まります!

# 津市がん検診と健康診査(39歳以下)

今年度の受診券送付対象者は6月下旬に郵送します。

健康管理に役立てるため、ぜひこの機会にご利用ください。

詳しくは広報津6月16日号と同時期に配布される「津市がん検診と健康診査のご案内」をご覧ください。

## 「大切な命のために 受けよう がん検診」



津市ピンクリボン

津市ピンクリボンとは、乳がん・子宮がんはもちろん、全てのがんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える津市オリジナルのシンボルマークです。